

Příbalový leták Antibakterin - H_2O_2



Potravinářský peroxid vodíku s minimálním obsahem příměsí ve formě 3% roztoku v ultra čisté vodě.

www.antibakterin.cz

Výrobce:	Cold Fusion Laboratory
Složení:	3% roztok čistého H_2O_2 (potravinářský peroxid vodíku, ultračistá voda)
Indikační skupina:	Dezinfekce, antibiotikum
Charakteristika:	Peroxid vodíku velmi účinně likviduje povrchové projevy plísní (mykóz)
Indikace:	Antibakterin H_2O_2 užívají všechny věkové skupiny jako podpůrný prostředek k léčbě mykóz přípravkem Antibakterin – Strong..
Kontraindikace:	Peroxid vodíku je silný oxidant. Pro vnitřní použití, je potřeba striktně zachovávat níže popsaná pravidla.
Nežádoucí účinky:	Při neúměrném vnitřním požití vzniká nadměrné množství volných radikálů, což může oslabovat imunitní systém. Při zasažení očí vypláchnout proudem vody a vyhledat lékaře.
Interakce:	Nevhodná je kombinace s léky, které obsahují antioxidanty – oslabuje jejich účinek.
Dávkování a způsob podávání:	Antibakterin H_2O_2 je určen především jako podpůrný prostředek pro léčbu mykóz přípravkem Antibakterin Strong..

Postiženou oblast je třeba:

1. omýt čistou vodou (omýt nohy, vypláchnout ústa,...)
2. osušit
3. postříkat přípravkem Antibakterin H_2O_2
4. dobře vydrhnout kartáčkem
5. opláchnout čistou vodou
6. osušit
7. *postříkat přípravkem Antibakterin Strong*
8. pokud možno nechat zaschnout

Tento postup aplikovat 2x – 3x denně až do úplného vymizení příznaků.

V případě, že se nejedná o dermatofytózu (plíseň vnější), ale o kandidózu – vnější projev plísně vnitřní, je potřeba léčbu doplnit vnitřním užíváním přípravku Antibakterin Medium. Jinak se příznaky pravděpodobně budou vracet. Doporučujeme též změnu stravovacích návyků. Hlavně minimalizovat příjem cukru a potravin obsahujících kvasnice.

Antibakterin H_2O_2 je také účinné antibiotikum. Při jeho vnitřním používání je ale nutné dodržovat určená pravidla. Oxidační účinky peroxidu vodíku fungují nejen proti patogenním organismům, ale proti všemu, co se postaví do cesty.

ZÁSADY VNITŘNÍHO UŽÍVÁNÍ H_2O_2

1. Používat jenom potravinářský, 3%ni peroxid vodíku. H_2O_2 pro průmyslové použití obsahuje stabilizátory.
2. Začít s užíváním jedné kapky do 0,5dl vody třikrát denně, postupně zvyšovat až na 10 kapek 3x denně. Jednorázová dávka **nesmí** překročit 10 kapek, celková denní dávka **nesmí** překročit 30 kapek 3%ního peroxidu.
3. Peroxid se musí brát jenom na lačno. Přítomnost jídla v žaludku může působit negativně. To znamená, že se může brát 2-3 hodiny po jídle a po užití se nesmí jíst alespoň 3/4 hodiny.
4. Peroxid se má brát pravidelně v desetidenních cyklech. Po každém cyklu se má udělat 3-5 denní přestávka. Další cyklus už může pokračovat s deseti kapkami. (Po prvním cyklu může dojít k intoxikaci organismu. Peroxid je velmi účinný při likvidaci anaerobních bakterií. Dalším nepříjemným projevem může být tvorba různých vyrážek. Jde o čištění těla od toxických látek). Při předávkování může docházet k vzniku škodlivých kyslíkových radikálů.

Skladování:

Dlouhodobé uchování přípravku je vhodnější v temnu, mimo zdroje elektromagnetického záření (mobily, monitory,...) a mimo přímý dosah topných těles. Takto skladovaný Antibakterin neztrácí účinnost po dobu minimálně 1 roku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

